

Un monde à nos portes

Chevreuil
Capreolus capreolus

Le chevreuil est le plus petit cervidé indigène d'Europe. Les bois du mâle ne présentent jamais plus de 3 cors châcun.

En hiver, les femelles acquièrent des touffes anales proéminentes.

Il se singularise par sa quasi-absence de queue.

La croupe est pâle, le reste de la robe est brun rougâtre en été.

En présence d'un danger, les fawns sont souvent "abandonnés" provisoirement par les femelles.

Plus âgés ils survivent leur mère quand elle fuit.

Le chevreuil est un animal sédentaire.

Ses moeurs sont plutôt crépusculaires, mais il est aussi visible en plein jour.

Gracieux et extrêmement farouche, le chevreuil est généralement solitaire hors saison des amours, mais il peut vaquer par petits groupes en hiver.

Excellent coureur et sauteur, il nage aussi très bien.

Le chevreuil est avant tout un animal forestier exploitant aussi bien les fourrés les plus denses que les lisières.



Martinot noir
Apus apus


Petit oiseau au corps aérodynamique, long de 16 à 17 cm ; les deux sexes sont noirs avec une gorge pâle, des ailes longues et étroites, en forme de faucille, la queue légèrement fourchue.

Il ne doit pas être confondu avec l'hirondelle, d'une famille distincte, qui présente un ventre blanc et une plus longue queue.

Presque toujours dans les airs, il ne se pose au sol que pour se reproduire, souvent sur les toits des maisons.

Vole à une grande vitesse au-dessus des villes, en bandes bruyantes.

Commun l'été dans nos régions, sauf dans l'extrême Nord.



Sphinx du peuplier
Laotioe populi

Grand papillon de nuit bien camouflé, d'une envergure de 7 à 9 cm. Mâle et femelle similaires, le mâle étant généralement plus petit, avec des ailes aux marbrures gris-brun, parfois rosâtres et des taches rouge orangé à la base des ailes postérieures.

Vole la nuit de juillet à octobre.

Les chenilles d'une taille impressionnante, jusqu'à 6 cm de long, sont vertes avec des rayures en diagonale ; leur huitième segment est généralement muni d'un crochet, trait caractéristique des larves de sphinx.

Elles se nourrissent de feuilles de peuplier et de saule.

Commun dans les jardins et les parcs pourvus de ces arbres.



Sanglier
Sus Scrofa

Le sanglier est un ongulé ou animal reposant sur le sol par un nombre pair de doigts.

Le sanglier fait partie du sous-ordre des suidés comme le cochon. C'est le seul de nos grands gibiers à être omnivore. Il possède quatre doigts bien développés à chaque membre, ce qui sera d'une grande importance pour la reconnaissance des traces au sol, les volcelets.

Le sanglier est une espèce grégaire.

Le mâle sanglier porte également le nom de verrat, la femelle s'appelle la laie, les petits sont les marcassins.


Il n'existe qu'une seule espèce de sanglier à travers toute l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord, même si la taille et le poids diffèrent beaucoup d'une région à l'autre.

Sur une année, le poids du sanglier peut varier considérablement... en automne, grâce à une nourriture abondante (céréales, fruits forestiers...). L'animal accumule des réserves considérables de graisse : le SAIN.

Cette couche de graisse peut représenter parfois jusqu'à 25 à 30 % de son poids d'été. Il la brûlera en hiver.


La longueur des défenses et des grès est liée à l'âge de l'animal et non au poids, donc à la nourriture !

Le sanglier est adulte pour la laie dès l'âge de 3 ans et pour le verrat à 5 ans.



Mésange bleue
Parus caeruleus

Minuscule oiseau ne dépassant pas 11 à 12 cm, le mâle et la femelle sont semblables avec une poitrine jaune, une culotte bleue, une face blanche, un dos vert-bleu et olive et un cerné oculaire noir bien visible. L'appel est une note aiguë répétée. Répandu dans les jardins, niche dans tous les trous des murs ou dans les arbres ; construit son nid dans des boîtes. Picore volontiers des graines.




Mésange charbonnière
Parus major

Oiseau remarquable malgré sa petite taille n'excédant pas 13 à 15 cm. Mâle et femelle similaires, avec une tête noire, des joues blanches, parfaitement visibles, et une poitrine jaune marquée d'une rayure centrale. Le noir de la tête et la rayure sur la poitrine permettent de distinguer cette espèce de la mésange bleue.

L'appel est émis sur des notes très variées et l'on a pu en recenser plus de 50 types. Commune dans de nombreux habitats, elle visite régulièrement les jardins, où elle niche, comptant parmi les oiseaux faisant le plus grand usage des distributeurs de graines.

Espèce répandue en Europe, résidant partout sauf à l'extrême nord.



Rouge-gorge
Erithacus rubecula

Petit oiseau trapu et familier de 13 à 15 cm de long. Le mâle et la femelle sont identiques, bruns en dessus, jaune pâle en dessous, avec une face et une poitrine rouge bien visibles.

Le jeune, rayé de brun, n'a pas la poitrine rouge. L'appel est un « tik-tik » persistant, le chant un faible gazouillement.

Oiseau de jardin connu de tous, facilement apprivoisable, picore dans les mangeoires ou se nourrit des invertébrés qu'il trouve dans la terre retournée. Répandu dans la majeure partie de l'Europe.



Ecureuil Roux
Sciurus vulgaris

Espèce familière. Mesure 20 à 25 cm de long, la tête comprise, et sa queue 15 à 20 cm.

La fourrure est marron roux, la face ventrale blanche. Les touffes de poils rousses de ses oreilles sont particulièrement fournies en hiver.

Construit des nids, généralement dans les conifères et se nourrit principalement de cônes de pins. Dans les régions où l'espèce abonde, il visite fréquemment les jardins, à la recherche de nourriture, s'approvisionnant assez bien.

Très répandu en Europe, mais confiné au Nord, en Angleterre, avec parfois des avancées dans le Sud.




Renard Roux
Vulpes vulpes

Mammifère de taille moyenne, semblable à un chien, pouvant atteindre 75 cm. Reconnaisable à ses oreilles pointées, à son museau fin, à sa longue queue fournie et à sa belle fourrure rousse, blanche sur le ventre.

Ses aboiements ou ses gémissements révèlent souvent sa présence. Essentiellement nocturne, il se déplace assez souvent dans la journée ou s'expose au soleil.

Charognard et omnivore, il se déplace assez souvent dans la journée ou s'expose au soleil.

Très répandu, le plus commun des carnivores en Europe.

Le sanglier et marcassins : sortent des bois à la nuit pour labourer les prairies à la recherche de tubercules et de larve

Faisan
Phasianus colchicus

C'est un animal proche de la poule, pouvant même se croiser avec cette dernière, mais qui donne alors un hybride stérile. Il existe de nombreuses espèces de faisans.

Les faisans lâchés pour la chasse sont aussi des hybrides stériles créés au départ de deux espèces de faisans.

Le faisan de Colchide, ou faisan de chasse (*Phasianus colchicus*), est courant dans nos régions. Il est chassé comme gibier et élevé pour sa chair.

Sa femelle s'appelle la faisane ou poule faisane.



Hermine
Mustela erminea

Petit mammifère carnivore d'une taille de 20 à 33 cm et d'un poids de 120 à 450 g, l'hermine a une longévité de 10 à 12 ans.

On la rencontre un peu partout sur la planète tant en Europe, qu'en Asie et Amérique du Nord.


Dans notre pays on peut la croiser dans les forêts, les campagnes cultivées, les haies, les bosquets, à la lisière des bois.

Très basse sur pattes, elle possède un corps très allongé. C'est un animal plus grand que la belette. Le dessus de son pelage est brun en été et le dessous blanc.

En hiver, surtout en montagne et dans le nord, elle devient entièrement blanche sauf le bout de sa queue qui reste noir.

Carnivore, l'hermine chasse les campagnols, les mulots, les rats, le lapin de garenne, les grenouilles, les lézards et les oiseaux s'attaquant même parfois aux faisans.

Tout à la fois nocturne et diurne, l'hermine est un animal curieux.



Belette
Mustela nivalis

Petit mammifère carnivore d'une taille de 13-29 cm et d'un poids de 35-250 gr, la belette vit environs Sans.

On la rencontre un peu partout sur la planète tant en Europe, qu'en Asie et Amérique du Nord.


Dans notre pays on peut la croiser dans les forêts, les campagnes cultivées, les haies, les bosquets, à la lisière des bois.

C'est un animal plus petit que l'hermine mais qui lui ressemble fortement. Le dessus de son pelage est brun-marron en été et le dessous blanc. En hiver, surtout en montagne et dans le nord, elle devient entièrement blanche y compris le bout de sa queue.

Carnivore, l'hermine a un régime alimentaire identique à celui de l'hermine.

Le nombre de portées et de jeunes dépend de l'abondance du campagnol, des champs, proie principale.

Diurne et nocturne, c'est un animal extrêmement vif. Les plus petites belettes étaient jadis considérées comme une espèce à part, la Belette naine, mais cette opinion n'est plus admise actuellement.



Lièvre
Lepus europaeus

A la fin de l'hiver dans les campagnes dénudées, les lièvres en proie aux feux de l'incendie se poursuivent incessamment et se bagarrent. On croit parfois assister à des matches de boxe. En d'autres circonstances, c'est un animal plutôt discret et même timide, ne quittant son gîte, une petite dépression creusée dans le sol, qu'au crépuscule et le regagnant, celui-ci ou un autre, à l'aube. On ne le verra en plein jour que s'il a été dérangé. Pas toujours très caché mais constamment aux aguets, il récupère de ses efforts nocturnes à la recherche de nourriture ou d'un(e) partenaire. Sûr de son mimétisme, il laissera passer sans réagir le promeneur mais détaillera à toute allure si celui-ci s'arrête ou le regarde avec trop d'insistance.

Il a bien entendu de bonnes raisons d'être méfiant car ses prédateurs, des oiseaux rapaces aux mammifères carnivores, sont nombreux et l'homme en est certainement le plus dangereux car le lièvre intéresse beaucoup le gastronome.

