


Un monde sous nos yeux



Chouette hulotte
Strix aluco

Le corps de cette chouette de taille moyenne mesure 30 à 40 cm de long. Les deux sexes sont semblables, pourvus d'un plumage brun moucheté et rayé, plus sombre sur le dos que sur la poitrine ; la face est ronde et grisâtre. Son appel familier « tououit-tou-hou » se combine parfois à un « ki-ouik » plus énergique. Oiseau des bois, elle est également commune dans les jardins avec des arbres à proximité, et en été, on peut souvent entendre les oisillons chanter. Se nourrit de souris, de campagnols, de petits oiseaux et de gros insectes. Habite toute l'Europe, sauf l'extrême Nord.



Pic épeiche
Dendrocopos major

Oiseau de taille moyenne au corps long de 22 à 24 cm. Le plumage de l'oiseau adulte est noir et blanc, coloré de rouge sous la queue ; le mâle est marqué d'une tache rouge sur la nuque, lors que la femelle est entièrement noire. Les jeunes oiseaux présentent une calotte rouge. Au printemps et au début de l'automne, les oiseaux des deux sexes tambourinent sur les arbres, émettant un son qui s'entend de loin. Cet habitant des bois ne dédaigne pas les jardins où il vient régulièrement chercher de la nourriture, appréciant surtout le vieux bois que les larves. Construit son nid dans les cavités des arbres. Commun dans toute l'Europe où il réside.



Merle Noir
Turdus merula

Oiseau de taille moyenne très familier au corps long de 24 à 26 cm. Le mâle est entièrement noir, à l'exception du bec et d'un cerne oculaire jaunes, tandis que la femelle est brune foncée avec une poitrine mouchetée et plus terne. Le mâle a un chant puissant et mélodieux, et les oiseaux des deux sexes émettent un cri d'alarme crépissant. Commune dans de nombreux habitats, cette espèce est particulièrement adaptée aux jardins, où elle abonde. Niche dans les haies et dans les fourrés, construisant son nid au début d'année, et mange pratiquement de tout, des framboises aux vers de terre. Réside partout en Europe, sauf dans l'extrême Nord.



Le noisetier : pousse spontanément et abondamment, permet de faire en automne de bien goûteuses récoltes. Il permet également de confectionner de jolis arcs nerveux, fort appréciés des petits garçons.



Le loir : ce sympathique petit amateur de fruits niche dans les arbres creux et descend rarement à terre. Lui aussi préfère sortir au crépuscule et à la nuit, passant ses journées (et surtout ses hivers) à dormir dans son trou.

Moineau domestique
Passer domesticus

Probablement le plus familier des oiseaux de jardin ; petit avec un corps de 14 à 16 cm de long. Le mâle a une tête et une nuque marron chocolat, un dos tacheté de brun et de gris, un ventre pâle. La femelle, plus terne, est dépourvue de calotte. L'appel est une insistante stridulation. Presque toujours associé à l'homme, il se nourrit des graines placées dans les mangeoires. Généralement construits autour des maisons, les nids forment de bruyantes colonies. Espèce abondante résidant en Europe. Le moineau frisé (P. montanus), doté d'une calotte brune, est moins répandu.



Pie bavarde
Pica pica

Oiseau d'une taille assez importante, très caractéristique, atteignant jusqu'à 50 cm, sa queue atteignant presque la longueur. Mâle et femelle identiques, avec un plumage blanc marqué de grosses bandes noires lustrées, lesquelles ne permettent pas de le confondre avec un autre oiseau. L'appel est un jacassement sonore et désagréable. Fréquent les jardins, en quête de nourriture, construit un nid en forme de dôme dans les arbres qui s'y prêtent. Charognard et petit prédateur se nourrissant d'œufs et de jeunes oiseaux, bien que pouvant manger presque de tout. Espèce abondante résidant dans toute l'Europe.



La fouine : se déplace dans les arbres avec une aisance impressionnante. Très opportuniste, elle se nourrit aussi bien au sol qu'en capturant loirs et écureuils.



Hérisson

Mammifère de taille petite à moyenne, avec un corps d'une longueur allant de 22 à 29 cm. On le reconnaît à ses poils piquants marron, blancs à la pointe, qui couvrent pratiquement tout son dos. Le ventre est le plus pâle, le nez pointu. Bien qu'on le rencontre dans plusieurs habitats, notamment les bois, le hérisson d'Europe fait, en quête de nourriture, de régulières incursions dans les jardins, où il peut même être domicilié. Il se nourrit de nombreux invertébrés, dont les limaces ; il appréciera aussi un bon bol de lait (mais pas trop souvent) ou autre aliment. Commun et très répandu dans toute l'Europe.

Le renoué, en créant des zones à écoulement imperméables, permet à beaucoup de petits mammifères de se nourrir en relative sécurité. Et ce sont, à l'automne, des dizaines d'espèces qui profitent de ces amoncellements.

Musaraigne carrelé
Sorex araneus

Très petit mammifère ne dépassant pas 6 à 8 cm, sans compter la queue longue approximativement de la moitié de sa taille. Ressemble vaguement à la souris, mais ne lui est pas apparentée. La robe, généralement brun foncé en dessus, plus pâle en dessous, est de couleur variable selon les individus et les saisons. Le museau est fin et pointu, avec des monticules. Se nourrit presque uniquement des invertébrés tels que les vers et les cloportes. On la rencontre souvent autour des jardins, où il n'est pas rare qu'elle soit la proie de chats.



Mulot
Apodemus sylvaticus

D'une taille de 8 à 13 cm, ce mammifère nettement plus gros que la souris grise, est pourvu d'une queue longue et fine. La fourrure est fauve en dessus, jaune sur les flancs et gris pâle en dessous. Habitant des bois et des prairies, il n'en fréquente pas moins les jardins et se réfugie dans les maisons, en quête de nourriture. Il reste cependant plus craintif que la souris grise. Répandu dans presque toute l'Europe.

